ANNEXE 224-A.5
DOTATIONS MÉDICALES

Dotation médicale pour un éloignement jusqu'à 6 milles d'un abri

LOCALISATION dans le contenant	EFFET thérapeutique	DÉNOMINATION commune internationale (DCI) et/ou molécule active (dosage unitaire) (*)	RÉFÉRENCE selon codification européenne ATC	NOM commercial du produit acheté (à indiquer ici)	LISTE	PRÉSENTATION	QUANTITÉ par conditionnement	NOMBRE de boîtes	DATE de péremption (à indiquer ici)
ALLERGOLOGIE	TRAITEMENT états de choc.	Epinéphrine (**) 1 mg/ml ou 0,3 mg/0,3 ml.	C01CA04		I	SC ou IM	Kit injection.	1	
ANTALGIQUES-ANTISPASMODIQUES	ANTI-DOULEUR/ ANTI-FIÈVRE.	Paracétamol (500 mg)	N02BE01			Comprimés	16 comprimés	1	
	ANTISPASMODIQUE	Phloroglucinol (200 mg).	A03AX12			Lyocs	10 Lyocs	1	
CARDIOLOGIE	CORONARODILATA-TEUR.	Trinitrine 0,15 mg	C01DA02		II	Solution	Flacon spray	1	
DERMATOLOGIE	ANTISEPTIQUE LOCAL.	Chlorhexidine aqueuse (0,05 %).	D08AC02			Solution	Unidose	10	
	CRÈME ÉCRAN TOTAL.	Indice 60.	D02BA			Crème.	Tube 50 ml	1	
	BRÛLURES traitement immédiat.	Trolamine	D02AX			Emulsion	Tube 96 g	1	
	C R È M E ANTIBACTÉRIENNE	Cuivre, zinc, sucralfate	D08AX			Crème	Tube 40 g	1	
ACCESSOIRES	SPARADRAP.					Rouleau.	Rouleau	1	
	COMPRESSES STÉRILES	20 x 20				Sachet unit	Paquet (par 10)	3	
	GANTS D'EXAMEN.					Paires	Taille moyenne	5	
	PANSEMENTS ADHÉSIFS	Stériles 4 côtés				Assortiment	Assortiment	1	
	CONTENTION COHÉ-SIVE					Rouleau	4,5 m x 7 cm.	1	
	GUIDE MÉDICAL.	Type guide premiers secours et soins.						1	

(*) L'achat du médicament générique est recommandé quand celui-ci existe.

(**) Epinéphrine 1 mg/1 ml : à conserver au frais (+ 2 °C à + 8 °C) et à l'abri de la lumière. A l'ombre, la trousse peut supporter des séjours de quelques semaines à température ambiante. Une coloration brun-rose de la solution traduit sa dénaturation et la rend inutilisable. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. Toute trousse conservée à température ambiante doit être détruite à la fin de la période d'activité des hyménoptères. Injection possible par multiples de 0,25 ml.

(**) Epinéphrine 0,3 mg/0,3 ml : à conserver à une température ne dépassant pas + 25 °C. Durée de vie du produit plus longue dans les conditions spécifiées. Délivrance d'une dose unique de 0,3 ml (pour l'enfant, une solution dosée à 0,15 ml/0,3 ml est nécessaire).

La fiche informative accompagnant le produit dans sa boite donne les informations de référence.

Les dates de péremption doivent être vérifiées régulièrement par le responsable du navire.

Les médicaments relevant de la réglementation de la liste I ou de celle de la liste II ne peuvent être utilisés que sur prescription délivrée par un médecin à distance.

Les sujets ayant des antécédents allergiques doivent être particulièrement vigilants.

Les quantités proposées correspondent à un équipage de six personnes maximum.

Conseils complémentaires :

Il est vivement recommandé de placer les produits dans un contenant étanche permettant un accès facile aux différents produits qui doivent être rangés selon une organisation rationnelle. La dotation doit être placée dans un endroit facilement accessible, à l'abri de la lumière et peu soumis aux variations thermiques.

Pour les enfants embarqués, il est nécessaire de prévoir, en fonction de l'âge, des dosages adaptés ou des produits de substitution pour un certain nombre de médicaments.

En cas de maladie préexistante et/ou de traitement en cours, cette liste doit être soumise au médecin traitant qui indiquera les éventuelles incompatibilités médicamenteuses et prescrira si besoin des médicaments complémentaires.